

((به نام خدا))

تعریف :

واژکتومی (بستن لوله در مردان) یک روش دائمی پیشگیری از بارداری برای آقایان است ، این روش با یک عمل جراحی سرپایی و بی مسی موضعی در کمتر از ۲۰ دقیقه انجام می گیرد. طی این عمل لوله های اسپرم بر، از طریق ایجاد یک سوراخ کوچک بر روی کیسه های بیضه ها بسته می شوند .

مزایا :

- ۱- روش دائمی است.
- ۲- اثر بخشی آن بالاست (میزان موفقیت حدود ۱۰۰٪) است .
- ۳- روش ساده ولی بی خطر است.
- ۴- در دراز مدت تاثیری بر سلامتی فرد نخواهد داشت .
- ۵- اثر منفی بر صفات ثانویه جنسی (ریش ، سبیل و صدای مردانه) قدرت مردانگی ، میل جنسی ، و کیفیت تماس جنسی ندارد.

- ۶- تاثیری روی حجم و ظاهر مایع منی ندارد.
- ۷- در زمان نزدیکی نیاز به استفاده از وسیله فاصی ندارد .

عوارض شایع :

درد، سوزش ، کبودی مختصر محل عمل که عموماً پس از یک هفته بر طرف می شود.

عوارض غیر شایع :

- ۱- هماتوم (تجمع خون در محل عمل)
 - ۲- عفونت پوست نامیه عمل
 - ۳- درد مزمن بیضه ها
- واژکتومی برای چه کسانی مناسب است ؟
- برای زوجینی که تعداد فرزندان خود را کافی می دانند و اصلاً تمایل به بچه دار شدن ندارند.
 - برای زوجینی که استفاده از سایر روشهای پیشگیری از بارداری برایشان امکان ندارد .

موارد منع :

هیچگونه منع مطلق وجود ندارد ، اما در برخی شرایط لازمست با احتیاط و یا با تأخیر انجام گیرد.

- آسیب به بیضه ها و یا سابقه عمل جراحی آن
 - آسیب سر آلت و یا عفونت پوست بیضه ها
 - واریس بیضه ها
 - عدم نزول بیضه یکطرفه
 - بیماری مقاربتی فعال
 - اسهال و استفراغ شدید
 - دیابت
- مراقبتهای پس از واژکتومی :
- ۱) کمپرس یخ تا ۲۴ ساعت
 - ۲) استراحت نسبی تا ۴۸ ساعت
 - ۳) تا یک هفته کار سنگین انجام ندهد
 - ۴) تا ۴ روز کویت نداشته باشد
 - ۵) تا زمانی که جواب ۲ اسپرموگرام منفی ندارد ، روش بک آپ داشته باشد
 - ۶) تمیز و خشک نگه داشته باشد
 - ۷) تا یک هفته بیضه بند ببندد
 - ۸) اگر حالت تورم و قرمزی تا یک هفته پس از عمل پا بر جا بود ، به پزشک مراجعه کند



فصلنامه علمی و پژوهشی
فصلنامه علمی و پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
معاونت آموزشی بیمارستان ۲۲ بهمن

واژکتومی

((بستن لوله در مردان))

مراجعات بعدی :

- یک هفته پس از عمل به پزشک ارائه دهنده
فدمت مراجعه شود.

- در ۲ نوبت (۳ ماه و ۴ ماه پس از عمل)
آزمایش مایع منی (جهت بررسی نبودن اسپرم در
مایع منی) انجام شود.

- لازم است تا اذ نتیجه آزمایشات و اطمینان از
موفقیت کامل عمل ، یک روش مطمئن پیشگیری
از بارداری (مانند کاندوم) مورد استفاده قرار گیرد.

*** تنظیم خانواده مسئولیتی مشترک بین ***

*** زن و مرد است ***

رفرنس :

بهداشت مادر و کودک

تالیف : سوسن پارسا

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.