Kaletra

(لوپیناویر + ریتوناویر)

هرگزمصرف دارو را فراموش نکنید.

دارو را با غذا مصرف کنید و در صورت عدم دسترسی به غذا می توانید دارو را با معده خالی مصرف کنید.

از شکستن و یا خرد کردن قرص اجتناب کنید و قرص را به صورت کامل با یک لیوان آب مصرف کنید.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص هر موقع که به یاد آوردید دارو را مصرف کنید ولی اگر کمتر از دو ساعت تا مصرف قرص بعدی زمان باقی است از مصرف قرص فراموش شده خودداری کنید.

نکات مهم

- درمان کووید ۱۹ علامتی است و آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری با منشأ ویروسی کاربردی ندارند. لذا از مصرف خودسرانه هر داروی دیگری جداً خودداری نمایید.
- داروها را دقیقاً مطابق دستور پزشک معالج خود مصرف نمایید و سایر نکات بهداشتی و مراقبتی را نیز رعایت نمایید.
- در صورت داشتن بیماری زمینه ای و مصرف داورهای دیگر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

سامانه‌های تلفنی ۱۹۱ ، ۴۰۳۰ و ۳۱۴۴۹۴۴۹

پاسخگوی سؤالات شما در مورد بیماری کرونا هستند.

منابع:

مطالب آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری

سازمان بهداشت جهانی

دفتر بهبود کیفیت وآموزش بیمارستان ۲۲بهمن	عنوان سند: پمفلت آموزشی \ویژه بیماران\	شماره سند: 99/EQ/013 تاریخ بازنگری : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره بازنگری۲

خودمراقبتی در بیمار مبتلا به بیماری کووید ۱۹

(مصرف داروها)

واحد آموزش بیمارستان ۲۲ بهمن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

هموطن گرامی؛ سلام

این برگه آموزشی دربردارنده نکاتی در مورد **پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا** است.
لطفاً این مطالب را با دقت مطالعه بفرمایید.

خوشحالیم که توانستید بیماری کرونا (کووید-۱۹) را شکست دهید و به سلامت از بیمارستان مرخص شوید.

باید به شما یادآور شویم که درمان شما هنوز کامل نشده و همچنان نیاز به مراقبت دارید.

ممکن است بر حسب شرایط، یک یا همه داروهای ذکر شده برای شما تجویز شده باشد.

لطفاً هنگام مصرف داروها به نکات ذکر شده در این پمفلت توجه فرمایید.

بیمار عزیز، از قطع خودسرانه دارو حتی در صورتی که احساس بهبودی می کنید، خودداری نمایید.

اسلتامیویر (تامی فلو)

بهتر است دارو با غذا مصرف شود ولی در شرایطی که به غذا دسترسی ندارید، میتوانید دارو را با معده خالی نیز مصرف کنید.

حتماً سر ساعت دارو را مصرف کنید و در صورتی که فکر می کنید ممکن است فراموش کنید، ساعت کوک کنید.

در صورتی که نمی توانید کپسول را قورت دهید می توانید محتویات آن را در یک شربت حل کنید و میل کنید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید هنگام به یادآوردن، سریع آن را مصرف کنید ولی اگر کمتر از دو ساعت به زمان مصرف قرص بعدی زمان دارید دیگر مصرف نکنید و هنگام رسیدن زمان مصرف از خوردن دو کپسول با هم اجتناب کنید.

در صورت مصرف داروهای دیگر حتماً اسامی و الگوی مصرف دارو ها را با پزشک خود در میان بگذارید.

هیدروکسی کلروکین

دارو را به موقع و سر ساعت مصرف کنید.

به فاصله چهار ساعت قبل و بعد از مصرف دارو از مصرف ترکیبات آنتی اسید مثل شربت و قرص و شربت آلومینیوم ام جی اس و شربت منیزیوم هیدروکسید خودداری کنید.

در صورتی که داروهای دیگر مصرف می کنید، پزشک خود را از مصرف آنها مطلع کنید.

بیمار عزیز، از مصرف داروها بدون نسخه پزشک خودداری نمایید.